



SANTÉ & SURVEILLANCE

Le point épidémiologique



Affaires sanitaires et sociales
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Réseau des médecins sentinelles de Nouvelle-Calédonie



#005
31 JUILLET 2025

L'ESSENTIEL :

LEPTOSPIROSE

140 cas dont 5 décès
86 cas en réanimation } depuis le 01/01/2025

VIRUS RESPIRATOIRES

Circulation stable

GASTRO ENTÉRITES

Circulation d'*E. coli*, de *Norovirus* et de *Campylobacter*

DENGUE

12 cas importés
8 cas autochtones } depuis le 01/01/2025
surveillance renforcée recommandée

LEPTOSPIROSE : CAS TOUJOURS ÉLEVÉS ET 5^{ÈME} DÉCÈS ENREGISTRÉ

Situation : Le nombre de cas de leptospirose reste élevé. Un cinquième décès a été enregistré début juillet. Les hospitalisations restent plus nombreuses que les années précédentes à la même période.

Profil des cas : Il s'agit majoritairement d'hommes exposés lors d'activités en milieu humide : pêche en eau douce, agriculture, travaux en zones boueuses ou humides.

Un risque toujours présent : La bactérie persiste dans les sols humides pendant plusieurs semaines. Le risque d'exposition reste donc élevé même sans pluie.

Zones les plus concernées : La province Nord et la côte Est.




Figure 1 : Nombre de cas de leptospirose déclarés et pluviométrie en Nouvelle-Calédonie du 01/01/2025 au 27/07/2025.

⚠ Pensez à questionner vos patients sur d'éventuelles **expositions en milieu à risque** en cas de fièvre, douleurs musculaires ou maux de tête. Une **prise en charge rapide et un traitement antibiotique précoce** sont essentiels pour éviter les formes sévères de la maladie.

[Plus de détails ici](#)

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025 :

CAS CONFIRMÉS	140 cas (dont 11 depuis le 1er juillet). supérieur à la moyenne des dix années précédentes sur la même période.
HOSPITALISATIONS	126, dont 68 % en réanimation (contre 50 % en moyenne les années précédentes).
DURÉE MOYENNE D'HOSPITALISATION	6 jours (total). 4 jours (réanimation et/ou soins de surveillance continue).
DÉCÈS	5 décès confirmés (moyenne d'âge : 44 ans).
FACTEURS DE RISQUE	Exposition en milieu humide (chasse, pêche, agriculture, eaux stagnantes). Augmentation des cas quelques jours après de fortes pluies.
POPULATION TOUCHÉE	76 % des cas = hommes (médiane d'âge : 36 ans). Zones rurales, principalement en province Nord et sur la côte Est (annexe 1).

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES (IRA) : TENDANCE STABLE




Figure 2 : Suivi du nombre de consultations et du pourcentage d'infections respiratoires aiguës au sein du réseau sentinelle depuis 15/07/2024 en Nouvelle-Calédonie.

TAUX DE CONSULTATIONS

Entre 1 % et 9 % depuis le 1er janvier 2025, 6 % durant la semaine 29 (la semaine 30 est incomplète).

TENDANCE

Une hausse des consultations pour IRA a été enregistrée à partir de la semaine 29, avec un dépassement du seuil de surveillance. Cette évolution pourrait s'expliquer en partie par la cocirculation de la grippe, du VRS et du Covid-19, accompagnée d'une légère hausse des cas de Covid-19.

GRIPPE

Depuis le 1er janvier 2025, **1 340 tests** ont été réalisés, soit environ 45 tests par semaine.

Parmi eux, **209 cas de grippe** ont été confirmés :

- 45 % A/H3N2
- 31 % A/H1N1
- 10 % B/Victoria
- 14 % A non sous-typés




Figure 3 : Évolution des cas de grippe en 2025 : nombre de cas confirmés et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

COVID-19




Figure 4 : Évolution des cas de Covid-19 en 2025 : nombre de cas et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

La circulation du virus est globalement stable, bien qu'une hausse des cas soit observée à partir de la semaine 29.

Depuis le début de l'année, **1394 tests** ont été réalisés.

- **60 cas** ont été enregistrés, dont **10 cas** depuis le 1er juillet.

VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS)

Depuis le 1er janvier 2025, **418 tests** ont été réalisés.

- **91 cas** de VRS confirmés, dont 3 depuis le 1er juillet.

Le VRS touche majoritairement les nourrissons, avec une moyenne d'âge des cas autour de 4 mois.




Figure 5 : Évolution des cas de VRS en 2025 : nombre de cas confirmés et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

GASTRO-ENTÉRITES AIGÜES

Depuis le début de l'année, une circulation soutenue d'infections gastro-intestinales est observée. Détails disponibles en **annexe 2**.

E.COLI	219 cas - dont 54 % <i>E.coli</i> entérotoxigène
NOROVIRUS	38 cas
CAMPYLOBACTER	19 cas
EIEC/SHIGELLA	16 cas
ENTAMOEBAS HISTOLYTICA	14 cas

ARBOVIROSES :

DENGUE	12 cas importés, dont 7 DENV-1 et 1 DENV-2 (Tahiti, Indonésie, Bali et Tonga) 8 cas autochtones, dont 7 DENV-1
CHIKUNGUNYA	1 cas importé (Réunion)

PASSAGES AUX URGENCES :

TENDANCE	Aucune suractivité aux urgences n'a été observée. Le nombre de passages ainsi que le taux d'hospitalisation après passages restent globalement stables.
----------	--



DANS LE MONDE :

CHIKUNGUNYA	Réunion plus de 54 410 cas dont 15 décès (tous plus de 70 ans)
	Mayotte 1 098 cas ont été signalés depuis le début de l'année
ROUGEOLE	Monde On observe une recrudescence importante des déclarations au niveau mondial
	Australie 77 cas ont été signalés depuis le début de l'année
	France 658 cas confirmés ont été signalés depuis le début de l'année
DENGUE	Fidji 8 708 cas de DENV-2 dont 4 décès
	Tahiti 2 364 cas de DENV-1 dont 1 décès



alerte.dass@gouv.nc



24.37.00 / 24.37.18




dass.gouv.nc




ANNEXES

LEPTOSPIROSE



Annexe 1 : Taux d'incidence de la leptospirose du 01/01/2025 au 27/07/2025 pour 10 000 habitants en Nouvelle-Calédonie.

GASTRO-ENTÉRITES-AIGÜES



Annexe 2 : Nombre de gastro-entérites aiguës identifiées biologiquement par le CHT, depuis le début de l'année en Nouvelle-Calédonie.