



SANTÉ & SURVEILLANCE

Le point épidémiologique



Affaires sanitaires et sociales
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Réseau des médecins sentinelles de Nouvelle-Calédonie



#004
16 JUIN 2025

L'ESSENTIEL :

LEPTOSPIROSE

120 cas dont 4 décès
75 cas en réanimation } depuis le 01/01/2025

GASTRO ENTÉRITES

Circulation notable d'**E.coli**, de
Norovirus et de **Campylobacter**

VIRUS RESPIRATOIRES

Circulation active du virus
respiratoire syncytial (VRS)

DENGUE

11 cas importés
7 cas autochtones } depuis le 01/01/2025
surveillance renforcée
recommandée

LEPTOSPIROSE : L'ÉPIDÉMIE SE POURSUIT

En mai, le nombre de cas reste élevé. Deux décès ont été enregistrés ce mois-ci, portant à quatre décès depuis le début de l'année. Le nombre d'hospitalisations reste supérieur à celui observé à la même période les années précédentes.

Rappel : Les cas concernent majoritairement des hommes ayant pratiqué des activités à risque :

- pêche en eau douce,
- agriculture,
- travaux en milieu humide.

La bactérie responsable peut survivre plusieurs semaines dans les sols humides, maintenant un risque d'exposition élevé même hors période de pluie. La province Nord et la côte Est restent les zones les plus concernées.




Figure 1 : Nombre de cas de leptospirose et pluviométrie déclarés en Nouvelle-Calédonie du 01/01/2025 au 08/06/2025.

⚠ Restez vigilants : une prise en charge rapide et un traitement antibiotique précoce sont essentiels pour éviter les formes sévères de la maladie. [Plus de détails ici](#)

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025 :

CAS CONFIRMÉS	120 cas (dont 27 depuis le 1er mai), supérieur à la moyenne des dix années précédentes sur la même période.
HOSPITALISATIONS	107, dont 70 % en réanimation (contre 50 % en moyenne les années précédentes).
DURÉE MOYENNE D'HOSPITALISATION	7 jours (total) 4 jours (réanimation et/ou soins de surveillance continue)
DÉCÈS	4 décès confirmés
FACTEURS DE RISQUE	Exposition en milieu humide (chasse, pêche, agriculture, eaux stagnantes). Augmentation des cas 15 jours après fortes pluies.
POPULATION TOUCHÉE	73 % des cas = hommes (médiane d'âge : 36 ans). Zones rurales, principalement province Nord et côte Est (annexe 1).

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES (IRA) : TENDANCE STABLE




Figure 2 : Suivi du nombre de consultations et du pourcentage d'infections respiratoires aiguës au sein du réseau sentinelle depuis 01/06/2024 en Nouvelle-Calédonie.

TAUX DE CONSULTATIONS

Entre 1 % et 9 % depuis le 1er janvier 2025, 8 % durant la semaine 22 (la semaine 23 est incomplète).

TENDANCE

Une hausse des consultations pour IRA a été enregistrée en semaine 22, avec un dépassement du seuil de surveillance. Cette tendance n'est pas confirmée en semaine 23. Aucune augmentation significative n'est observée dans la surveillance de la grippe, du Covid-19, de la coqueluche ou du VRS.

GRIPPE

Depuis le 1er janvier 2025, **1 058 tests** ont été réalisés, soit environ 46 tests par semaine.

Parmi eux, **180 cas de grippe** ont été confirmés :

- 40 % A/H3N2
- 36 % A/H1N1
- 8 % B/Victoria
- 16 % A non sous-typés




Figure 3 : Évolution des cas de grippe en 2025 : nombre de cas confirmés et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

COQUELUCHE




Figure 4 : Évolution des cas de coqueluche et des syndromes coquelucheux en 2025 : nombre de cas et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

Bien que la circulation de la bactérie reste faible, quelques cas continuent d'être confirmés. Depuis le début de l'année,

- **56 cas** ont été enregistrés, dont **5 cas** depuis le 1er mai.

⚠ Surveillance recommandée : Un test PCR doit être effectué en cas de suspicion
([plus d'infos : alerte du 26/07/2024](#))

VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS)

Depuis le 1er janvier 2025, **335 tests** ont été réalisés.

- **80 cas** de VRS confirmés, dont 30 depuis le 1er mai.

Le VRS touche majoritairement les nourrissons, avec une moyenne d'âge des cas autour de 4 mois.




Figure 5 : Évolution des cas de VRS en 2025 : nombre de cas confirmés et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS

Depuis le début de l'année, une circulation soutenue d'infections gastro-intestinales est observée. Détails disponibles en [annexe 2](#).

E. COLI	165 cas - dont 58 % <i>E.coli</i> entéropathogène
NOROVIRUS CAMPYLOBACTER EIEC/SHIGELLA	30 cas 13 cas 13 cas

ARBOVIROSES :

DENGUE	11 cas importés, dont 8 DENV-1 et 1 DENV-2 (Tahiti, Indonésie, Bali et Tonga) 7 cas autochtones, dont 4 DENV-1
CHIKUNGUNYA	1 cas importé (Réunion)



DANS LE MONDE :

CHIKUNGUNYA

Réunion



plus de 47 500 cas dont 15 décès (tous plus de 70 ans)

Mayotte



560 cas ont été signalés depuis le début de l'année

ROUGEOLE

Monde



On observe une recrudescence importante des déclarations au niveau mondial

Australie



77 cas ont été signalés depuis le début de l'année

France



186 cas ont été signalés depuis le début de l'année

DENGUE

Fidji



8 708 cas de DENV-2 dont 4 décès

Tahiti



2 086 cas de DENV-1 dont 1 décès



alerte.dass@gouv.nc




24.37.00 / 24.37.18



dass.gouv.nc


ANNEXES

LEPTOSPIROSE



Annexe 1 : Taux d'incidence de la leptospirose du 01/01/2025 au 08/06/2025 pour 10 000 habitants en Nouvelle-Calédonie.

GASTRO-ENTÉRITES-AIGÜES



Annexe 2 : Nombre de gastro-entérites aiguës identifiées biologiquement par le CHT, depuis le début de l'année en Nouvelle-Calédonie.