

Fièvre Jaune

Une 2ème injection dans la vie sera peut-être nécessaire dans les situations suivantes :

- ➔ Si la première injection a été réalisée :
 - avant l'âge de 2 ans,
 - pendant une grossesse.
- ➔ En cas d'immunodépression.
- ➔ Futurs résidents en **Guyane Française**.
- ➔ **Épidémie de Fièvre Jaune dans le pays où vous prévoyez de voyager.**

Centre Santé et Voyages

Fièvre Jaune

Protégez-vous

◆
Demandez à un professionnel si votre destination est à risque de Fièvre Jaune.

◆
Vaccinez vous contre la Fièvre Jaune (possible seulement au Centre Santé et Voyages de la DASS NC).

◆
Protégez-vous des piqûres de moustiques.

Centre Santé et Voyages

FIEVRE JAUNE

Voyages et vaccination contre la Fièvre Jaune - 2016 -



Centre Santé et Voyages

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ

Vous partez en voyage dans un pays où circule le virus de la Fièvre Jaune ?

Protégez votre santé, en étant **vacciné** et en **luttant contre les piqûres de moustiques**



- **renseignez-vous** avant de partir,
- **suivez attentivement les recommandations** qui suivent,
- **signalez sans attendre** à un médecin tout problème de santé qui surviendrait après la vaccination,
- au retour, remplissez correctement votre **Fiche de déclaration sanitaire** à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie.

Qu'est-ce que la Fièvre Jaune ?

Une maladie virale



Afrique

Amérique du sud

(Amérique centrale)

- La Fièvre Jaune est une maladie infectieuse due à un **virus, transmis par un moustique** qui pique le jour.
- Tous les pays du monde ne sont pas concernés par la Fièvre Jaune : le virus circule **seulement dans certains pays d'Afrique et d'Amérique centrale ou du Sud** (voir les zones en jaune sur la carte). Il n'y a **pas de Fièvre Jaune en Nouvelle-Calédonie**.
- Une **épidémie** pourrait cependant survenir par un voyageur infecté revenant en Nouvelle-Calédonie, car le **moustique vecteur y est présent** (*Aedes aegypti*).
- L'infection peut rester inapparente, mais quand des signes apparaissent, **l'évolution peut être grave** et conduire à la mort.
- Après une **incubation silencieuse de quelques jours**, les premiers signes sont une **fièvre**, des **douleurs musculaires** et des **vomissements**.
- L'évolution peut se compliquer, avec une **jaunisse** et des **hémorragies**, suivies d'un **coma** et parfois d'un **décès**.

Comment se protéger ?

Se protéger des moustiques

- Le **moustique** qui transmet le virus pique la **journée**, avec une **prédominance en début et fin de journée**.
- Utilisez des **répulsifs anti moustiques sur les zones de peau nue** (sans vêtement) **3 fois par jour**.
- L'application peut être différente chez les **enfants** et les **femmes enceintes**

Renseignez-vous.




Un vaccin très efficace

- Le vaccin contre la Fièvre Jaune (Stamaril*) est très efficace : la **protection est de 99%**, un mois après l'injection.
- Vous devrez être immunisé **au moins 10 jours avant l'arrivée** dans le pays à risque.
- **Les échecs de vaccination sont très rares (1 %)** et la **protection est très longue**, sauf en cas d'immunité réduite.
- Le médecin doit rechercher une contre-indication et vous expliquer les éventuels effets secondaires avant de réaliser l'injection.



Le vaccin est réglementé

- L'utilisation du vaccin contre la Fièvre Jaune est soumise au règlement sanitaire international (RSI 2005) de l'OMS.
- C'est pourquoi vous ne pourrez le trouver que dans **certains centres, désignés par les gouvernements de chaque pays**. En Nouvelle-Calédonie, **seul le Centre Santé et Voyages de la DASS NC**, à Nouméa, est habilité à stocker et délivrer ce vaccin.
- Après l'injection, le médecin vous remettra un **Certificat international de vaccination contre la Fièvre Jaune, seul document reconnu** aux frontières des différents pays.



Seulement au Centre Santé et Voyages (CSV) de la DASS NC !

PRENEZ-EN GRAND SOIN !!

Ce qui change en 2016

Renseignez-vous toujours avant un voyage ...

- Avant juillet 2016, la validité du certificat n'était que de **10 ans**. Désormais, **dans la majorité des cas, une seule vaccination dans la vie sera suffisante**.
- Une **2ème injection** pourra être nécessaire dans **certaines circonstances** (voir page suivante) ou si vous vous rendez dans une **zone d'épidémie**.